

Analytische Zahlentheorie

1. Übungsblatt

Abgabe: vor der nächsten Übungsstunde

Aufgabe 1 (4 Punkte)

Sei $k \in \mathbb{N}$. Beweisen Sie, dass $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ mit $f(n) := n^k$ streng multiplikativ ist. Sei τ die Funktion, die der natürlichen Zahl n die Anzahl der Teiler von n zuordnet und σ mit $\sigma(n) := \sum_{d|n} d$ die Teilersummenfunktion. Zeigen Sie, dass τ und σ nicht streng multiplikativ sind.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Beweisen Sie: Zwei streng multiplikative Funktionen $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ mit $f(1) = g(1) = 1$ sind genau dann gleich, wenn für alle Primzahlen p gilt $f(p) = g(p)$.

Aufgabe 3 (6 Punkte)

Schließen Sie aus Aufgabe 4 der Stundenübung, dass die summatorische Funktion $\sum_{d|n} f(d)$ einer multiplikativen Funktion f multiplikativ ist. Beweisen Sie damit, dass τ und für beliebiges $k \in \mathbb{N}$ σ_k mit $\sigma_k(n) := \sum_{d|n} d^k$ multiplikativ sind.

Aufgabe 4 (8 Punkte)

Berechnen Sie explizit für $n \leq 10$ die Funktionswerte von $(\mu * \tau)(n)$, $((\mu * \tau) * \sigma)(n)$, $(\tau * \sigma)(n)$ und $(\mu * (\tau * \sigma))(n)$.

Aufgabe 5 (8 Punkte)

Geben Sie für $n \leq 10$ explizit $\tau^{-1}(n)$ an und kontrollieren Sie das Resultat durch Berechnung von $(\tau^{-1})^{-1}(n)$. Berechnen Sie ferner $\varphi^{-1}(17 \cdot 31)$ und $\text{id}^{-1}(11 \cdot 17 \cdot 29)$.

Analytische Zahlentheorie

2. Übungsblatt

Abgabe: vor der nächsten Übungsstunde

Aufgabe 6 (8 Punkte)

Sei $n \in \mathbb{N}$, dann heißen die $z \in \mathbb{C}$ mit $z^n = 1$ die n -ten Einheitswurzeln. Es gibt n n -te Einheitswurzeln, diese haben die Darstellung $z_k = e^{2\pi i k/n} = \cos(\frac{2\pi i k}{n}) + i \sin(\frac{2\pi i k}{n})$, $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Beweisen Sie:

- (i) Für $n > 1$ ist die Summe der $n-1$ von 1 verschiedenen Einheitswurzeln -1 .
- (ii) Ist z eine n -te Einheitswurzel, so ist auch $\frac{1}{z}$ eine n -te Einheitswurzel.
- (iii) Das Produkt zweier n -ter Einheitswurzeln ist eine n -te Einheitswurzel.
- (iv) Ist $n = a \cdot b$ mit $\text{ggT}(a, b) = 1$, so lässt sich jede n -te Einheitswurzel als Produkt einer a -ten Einheitswurzel darstellen.

Aufgabe 7 (8 Punkte)

Für $q, h \in \mathbb{N}$ gilt

$$c_q(h) = \sum_{\substack{1 \leq a \leq q \\ \text{ggT}(a, q) = 1}} \exp\left(2\pi i \frac{ah}{q}\right) = \sum_{d | \text{ggT}(q, h)} \mu\left(\frac{q}{d}\right) d.$$

Aufgabe 8 (8 Punkte)

Sei $k \in \mathbb{N}$ und $I_k : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ mit $I_k(n) = n^k$. Beweisen Sie mit der Definition der Faltung, dass $\tau = \varepsilon * \varepsilon$ und $\sigma_k = I_k * \varepsilon$. Verwenden Sie $\varepsilon^{-1} = \mu$ zum Beweis von $\varphi = \mu * \text{id}$.

Aufgabe 9 (6 Punkte)

Sei $D = \mathbb{C}$. Untersuchen Sie, welche der folgenden Funktionen $f, g : D \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph sind. $f(z) := \text{Re}(z) - i \text{Im}(z)$, $g(z) := (\text{Re}(z))^2 - (\text{Im}(z))^2 + 2i \text{Re}(z) \text{Im}(z)$, $z \in D$.

Analytische Zahlentheorie

3. Übungsblatt

Abgabe: vor der nächsten Übungsstunde

Aufgabe 10 (6 Punkte)

Schreiben Sie $f(z) := \sin(z)$ in der Gestalt $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$, $x, y \in \mathbb{R}$ und zeigen Sie, dass u und v für alle $z = x + iy \in \mathbb{C}$ die **Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen** erfüllen. Geben Sie die Potenzreihenentwicklung von f und f' an.

Aufgabe 11 (8 Punkte)

Entwickeln Sie

$$f(z) := \frac{1}{(z^2 + 4)(z^2 + 9)} = \frac{i}{20} \cdot \frac{1}{z + 2i} - \frac{i}{20} \cdot \frac{1}{z - 2i} - \frac{i}{30} \cdot \frac{1}{z + 3i} + \frac{i}{30} \cdot \frac{1}{z - 3i}$$

an der Stelle 1 in eine Potenzreihe und geben Sie den zugehörigen Konvergenzradius an.

Aufgabe 12 (10 Punkte)

Sei $G \subset \mathbb{C}$ ein Gebiet und W ein einfach geschlossener Integrationsweg, der mit samt seinem Innengebiet IW in G liegt, und der IW positiv (entgegen dem Urzeigersinn) umläuft. Die Funktion f sei holomorph in G bis auf isolierte Singularitäten, die nicht auf W liegen, dann gilt $\int_W f(z) dz = 2\pi i \sum_{z \in IW} \text{res}(f, z)$, wobei $\text{res}(f, z) = 0$, wenn z kein Pol und keine wesentliche Singularität von f ist. Berechnen Sie mit dem Residuensatz $\int_W \frac{1}{(s^2+4)(s^2+9)} ds$ für $W(t) := 5i + r(\cos t + i \sin t)$ mit $t \in [0, 2\pi]$ und $r \in \{1, 4, \frac{15}{2}, 10\}$. Berechnen Sie mit dem Residuensatz das reelle Integral $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+4)(x^2+9)} dx$.

Aufgabe 13 (6 Punkte)

Beweisen Sie, dass die **Dirichletreihe** $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^s}$ für $\text{Re}(s) > 0$ konvergiert und genau für $\text{Re}(s) > 1$ absolut konvergiert.

Analytische Zahlentheorie

4. Übungsblatt

Abgabe: vor der nächsten Übungsstunde

Aufgabe 14 (4 Punkte)

Beweisen Sie, dass für alle $z \in \mathbb{C}$, die keine Nullstellen von $\cos(\pi z)$ sind, gilt

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} + z\right) \Gamma\left(\frac{1}{2} - z\right) = \frac{\pi}{\cos(\pi z)}.$$

Aufgabe 15 (4 Punkte)

Zeigen Sie für alle $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt $|\Gamma(iy)|^2 = \frac{\pi}{y \sinh(\pi y)}$.

Aufgabe 16 (6 Punkte)

Beweisen Sie, dass für alle $x > 0$ gilt $\int_x^{x+1} \log(\Gamma(t)) dt = x \log(x) - x + \log(\sqrt{2\pi})$.

Aufgabe 17 (8 Punkte)

Zur Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ existiere die Fouriertransformierte $\widehat{f}(x) := \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i t x} dt$. Sei $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, b \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass die Funktion $x \mapsto f(ax + b)$ die Fouriertransformierte $x \mapsto \frac{1}{|a|} e^{2\pi i \frac{bx}{a}} \widehat{f}\left(\frac{x}{a}\right)$ hat. Für $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $g(x) := e^{-|x|}$ gilt $\widehat{g}(x) = \frac{2}{1+4x^2\pi^2}$. Geben Sie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ an mit $\widehat{f}(x) = \frac{1}{x^2+1}$.

Aufgabe 18 (8 Punkte)

Wenden Sie die Rechenregeln für die Fouriertransformation an, um die Fouriertransformierten der Funktionen $f_1(x) := \frac{-16x\pi^2}{(1+4x^2\pi^2)^2}$ und $f_2(x) := xe^{-4x^2}$ zu berechnen.

Analytische Zahlentheorie

5. Übungsblatt

Abgabe: vor der nächsten Übungsstunde

Aufgabe 19 (8 Punkte)

Sei $t > 0$. Beweisen Sie mit Hilfe der Poissonschen Summenformel $\sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-t|m|} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{2t}{t^2 + 4\pi^2 k^2}$ und zeigen Sie, dass $\frac{2}{1 - e^{-t}} - 1 = \frac{2}{t} + 4t \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{t^2 + 4\pi^2 k^2}$.

Aufgabe 20 (6 Punkte)

Seien $x, y \in \mathbb{R}$ und $z = x + iy$. Beweisen Sie mit der Eulerschen Formel, dass $1 - e^{-z} = 0$ genau dann, wenn $z = 2k\pi i$ mit $k \in \mathbb{Z}$. Zeigen Sie, dass die in dem Kreisring $\{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z| < 2\pi\}$ konvergente Laurentreihe von $\frac{2}{1 - e^{-z}}$ die Gestalt $1 + \frac{2}{z} + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} z^{2k-1}$ hat.

Aufgabe 21 (8 Punkte)

Beweisen Sie, dass für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt $\zeta(2k) = \frac{(-1)^{k+1} (2\pi)^{2k}}{2(2k)!} B_{2k}$. Geben Sie für $j \in \{2, 4, 6, 8, 10\}$ die Summen $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^j}$ exakt und näherungsweise (Taschenrechner) an.

Aufgabe 22 (8 Punkte)

Beweisen Sie mit Hilfe der Funktionalgleichung

$$\pi^{-\frac{s}{2}} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \pi^{-\frac{1}{2}(1-s)} \Gamma\left(\frac{1}{2}(1-s)\right) \zeta(1-s)$$

der Riemannschen Zetafunktion, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\zeta(1 - 2n) = -\frac{B_{2n}}{2n}$. Geben Sie $\zeta(-1), \zeta(-3), \zeta(-5), \zeta(-7)$ explizit an.

Analytische Zahlentheorie

6. Übungsblatt

Abgabe: vor der nächsten Übungsstunde

Aufgabe 23 (8 Punkte)

Zeigen Sie, dass für alle $k, n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\int_0^{2\pi} \cos(kx) \sin(nx) dx = 0 \text{ und } \int_0^{2\pi} \cos(kx) \cos(nx) dx = \begin{cases} \pi, & \text{für } k = n, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Aufgabe 24 (6 Punkte)

Die Bernoullischen Polynome $B_n(x)$ sind definiert durch

$$\frac{t \cdot e^{xt}}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n(x) \frac{t^n}{n!}.$$

Beweisen Sie, dass $B_0(x) = 1$ und für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k x^{n-k}$. Bestimmen Sie mit dieser Formel $B_8(x)$.

Aufgabe 25 (8 Punkte)

Sei $f(x) = \begin{cases} B_6(x), & \text{für } 0 \leq x \leq 1, \\ B_6(x - [x]), & \text{sonst.} \end{cases}$

Skizzieren Sie $\{(x, f(x)) \mid -2 \leq x \leq 3\}$. Lesen Sie aus der Fourierdarstellung von $f(x)$ den Wert $\zeta(6)$ ab.

Aufgabe 26 (8 Punkte)

Es sei $r_0(x) = \frac{x}{1+x}$, $r_1(x) = x \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{1+x} \right)$ und $r_n(x) = x \cdot \frac{d}{dx} (r_{n-1}(x))$, $n \in \mathbb{N}$.

Berechnen Sie explizit $r_3(x)$ und $r_4(x)$ und damit die Zahlen $\zeta(-3)$, $\zeta(-4)$.

Analytische Zahlentheorie

7. Übungsblatt

Abgabe: vor der nächsten Übungsstunde

Aufgabe 27 (8 Punkte)

Beweisen Sie für $j \in \mathbb{N}$, $\operatorname{Re} s > 1$

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^j \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left(\prod_{m=0}^{2k-2} (s+m) \right) - \frac{1}{(2j+1)!} \left(\prod_{m=0}^{2j} (s+m) \right) \int_1^{\infty} B_{2j+1}(x-[x])x^{-s-2j-1} dx.$$

Diese Darstellung setzt $\zeta(s)$ analytisch fort auf die Halbebene $\sigma := \operatorname{Re} s > -2j$. Berechnen Sie für $j = 2$ mit der angegebenen Formel $\zeta(-2)$ und $\zeta(-3)$.

Aufgabe 28 (6 Punkte)

Sei $n \in \mathbb{N}$. Berechnen Sie $\operatorname{ord}(z^n)$, $\operatorname{ord}(\cos z)$, $\operatorname{ord}(\exp(z^n))$.

Aufgabe 29 (8 Punkte)

Berechnen Sie mit der Jensenschen Formel

$$\int_0^{2\pi} \log(|625e^{4it} + 125e^{3it} - 125e^{2it} + 5e^{it} - 6|) dt$$

Hinweis: $t^4 + t^3 - 5t^2 + t - 6 = (t^2 + 1)(t^2 + t - 6)$.

Aufgabe 30 (8 Punkte)

Berechnen Sie mit der Jensenschen Formel

$$\int_0^{2\pi} \log(5 + 4 \cos t) dt.$$

Hinweis: Berechnen Sie $|(3e^{it} + 2)^2|$.

Analytische Zahlentheorie

8. Übungsblatt

Abgabe: vor der nächsten Übungsstunde

Aufgabe 31 (8 Punkte)

Beweisen Sie mit dem Maximumprinzip das Minimumprinzip: Es sei $G \subset \mathbb{C}$ ein Gebiet und $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Ist f in G nicht konstant und gibt es ein $a \in G$ mit $|f(a)| \leq |f(z)|$ für alle $z \in G$, so ist $f(a) = 0$.

Verwenden Sie das Minimumprinzip zum Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra: Jedes Polynom über \mathbb{C} vom Grad ≥ 1 hat (mindestens) eine Nullstelle in \mathbb{C} .

Aufgabe 32 (8 Punkte)

Berechnen Sie für $f(z) := z^2 + 3z + 3$

$$\max_{|z| \leq 3} |f(z)|, \min_{|z| \leq 3} |f(z)| \text{ und } \min_{|z| \leq 1} |f(z)|.$$

Aufgabe 33 (6 Punkte)

Es sei W der geschlossene Weg, der zusammengesetzt ist aus dem geraden Weg von $-3 - 2i$ nach $3 - 2i$, dem geraden Weg von $3 - 2i$ nach $3 + 2i$, dem geraden Weg von $3 + 2i$ nach $-3 + 2i$, dem geraden Weg von $-3 + 2i$ nach $-3 - 2i$. Berechnen Sie für $f(z) := \exp(2z - i)(z^2 + 1)^{-1}(z^2 + 9)^{-1}$ das Integral

$$\int_W \frac{f'(z)}{f(z)} dz.$$

Aufgabe 34 (8 Punkte)

Zeigen Sie, dass für eine Nullstelle des Polynoms $p(z) = z^4 + 6z + 3$ gilt $|z| < 1$ und für die anderen Nullstellen gilt $1 < |z| < 2$.

Hinweis: Wenden Sie den Satz von Rouché zunächst an mit $f(z) := z^4$, $g(z) := 6z + 3$, $W(t) := 2 \exp(it)$, $t \in [0, 2\pi]$ und dann mit $f(z) := 6z$, $g(z) := z^4 + 3$, $W(t) := \exp(it)$, $t \in [0, 2\pi]$.

Analytische Zahlentheorie

9. Übungsblatt

Abgabe: vor der nächsten Übungsstunde

Aufgabe 35 (8 Punkte)

Begründen Sie, warum aus

$$\int_0^1 \frac{\zeta'(x+i)}{\zeta(x+i)} dx = 0.96\dots + i \cdot 0.55\dots, \quad i \int_1^{15} \frac{\zeta'(1+it)}{\zeta(1+it)} dt = -0.48\dots + i \cdot 1.84\dots,$$
$$\int_1^0 \frac{\zeta'(x+15i)}{\zeta(x+15i)} dx = 0.43\dots + i \cdot 1.07\dots, \quad i \int_{15}^1 \frac{\zeta'(it)}{\zeta(it)} dt = -0.91\dots + i \cdot 2.81\dots$$

folgt, dass $\zeta(s)$ im Bereich $\{s \in \mathbb{C} \mid 0 \leq \operatorname{Re} s \leq 1 \text{ und } 1 \leq \operatorname{Im} s \leq 15\}$ genau eine Nullstelle ρ hat und dass $\operatorname{Re} \rho = \frac{1}{2}$ und $14 < \operatorname{Im} \rho < 15$ gilt.

Aufgabe 36 (8 Punkte)

Es sei $n \in \mathbb{N}$ und $\pi(n)$ die Anzahl der Primzahlen $\leq n$. Zeigen Sie, dass für alle $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ gilt $\pi(2^{k+1}) \leq 2^k$.

Hinweis: Überprüfen Sie die Ungleichung für $0 \leq k \leq 3$ direkt und beweisen Sie für $k \geq 3$ die Ungleichung mit vollständiger Induktion.

Aufgabe 37 (6 Punkte)

Beweisen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ $\prod_{p \in \mathbb{P}, n < p \leq 2n} p$ ein Teiler von $\binom{2n}{n}$ ist.

Aufgabe 38 (8 Punkte)

Es sei

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & \text{falls } n = p^k \text{ (} p \in \mathbb{P}, k > 0 \text{),} \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases}$$

$x > 2, T > 1, x_1 = \min \{p^k \mid p \in \mathbb{P}, k \in \mathbb{N}, p^k > x\}, c = 1 + \frac{1}{\log x}$. Zeigen Sie mit den in dem Beweis von Satz 8.1 angegebenen Methoden, dass

$$\sum_{x_1 < n < 2x} \Lambda(n) \cdot \left(\frac{x}{n}\right)^c \cdot \min \left\{ 1, \frac{1}{T |\log(\frac{x}{n})|} \right\} \ll \frac{x}{T} (\log x)^2.$$